# *Mytilicola intestinalis*

**Extrait des résultats du réseau REMOULNOR**

**Saison 2023**

Bulletin REMOULNOR

Echantillonnage SMEL - Analyses LABEO 50

**Dates d'échantillonnages et d'analyses** : entre semaines 35 à 44

**Localisation des stations REMOULNOR**




● **Stations expérimentales**

# Sites de production mytilicole

**La classification des risques par rapport au taux d'infestation** est issue du rapport :

Basuyaux et al, (2011) : Etude et cartographie du *Mytilicola intestinalis* sur les côtes du département de la Manche, SMEL/CE – prod/2011-01

Contact : BLIN Jean-Louis, SMEL, Blainville sur mer, 02 33 76 57 74, jlblin@smel.fr

# Résultats

Diffusion : 13/11/2023




Taux d'infestation moyen régional – Résultats 2023 (bleu)




Taux d'infestation par station – Résultats 2023 (bleu)

**Interprétation des résultats :**

Le taux d'infestation moyen régional 2023 est de nouveau en baisse. Le niveau de risque régional reste malgré tout classé comme assez faible.

Les taux d'infestation mesurés à l'automne 2023, représentent des risques :

- « Faibles » pour les stations de Roquette ainsi que Utah,
- « Assez faibles » pour toutes les autres stations, les infestations les plus fortes étant observées à Hauteville.

Contact : BLIN Jean-Louis, SMEL, Blainville sur mer, 02 33 76 57 74, jlblin@smel.fr